

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日	
登録診療科	血液内科	申請医師	
レジメン名	MEC		
疾患名	急性骨髄性白血病	適応の備考	AML(再難治性)
適応分類			
1コース日数	21 日間	総コース数	コース 催吐性リスク 軽度
抗がん剤投与量・投与日	ノバントロン8mg/m <sup>2</sup> day1-3、エトポシド100mg/m <sup>2</sup> day1-5、キロサイド100mg/m <sup>2</sup> day1-7		
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)	(day)		

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	側管 点滴静注	グラニセトロン注ハッグ1mg/50mL	1 本 / body	30 分	●	●	●	●	●	●															
2	側管 点滴静注	生食100mL ノバントロン注	1 本 / body 8 mg / m <sup>2</sup>	30 分	●	●	●																		
3	側管 点滴静注	生食500mL エトポシド注	1 本 / body 100 mg / m <sup>2</sup>	60 分	●	●	●	●	●																
100mgあたり、250mLの生食または5%ブドウ糖液に混和する																									
4	主ルート 精密持続 静注	生食500mL キロサイド注	1 本 / body 100 mg / m <sup>2</sup>	24 時間	●	●	●	●	●	●	●														
5	主ルート 点滴静注	生食50mL キロサイドフラッシュ用	1 本 / body	5 分								●													

【投与上の注意】

エトポシド: DEHPフリー点滴セット使用。

キロサイド: 大量投与時、結膜炎予防のためのステロイド点眼を行う。例えば0.1%フルメロン点眼、1日3回、両眼、キロサイド投与前日から投与終了の翌日まで。