レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日			
登録診療科	血液内科	申請医師		化学療法委員会承認年月	平成　　年　　月
レジメン名	高齢者AML(Ⅱ)地固め2				
疾患名	急性骨髄性白血病	適応の備考	65歳以上		
適応分類	地固め療法				
1コース日数	14　日間	総コース数	2　コース	催吐性リスク	day1-2:中等度、day3:軽度、day4-5:最小度
抗がん剤投与量・投与日	キロサイド80mg/㎡　day1-5、ダウノマイシン30mg/㎡　day1-2、エトポシド100mg/㎡　day1-3				

治療スケジュール　・　投与日程（投与日は●）　　(day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量		投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	側管	グラニセトロン注バッグ1mg/50mL	1	本 / body	30 分	●	●	●	●	●									
	点滴静注																		
2	側管	生食100mL	1	本 / body		●	●												
	点滴静注	ダウノマイシン注	30	mg / ㎡	30 分	●	●												
				/															
	70歳以上は25mg/㎡へ減量																		
3	側管	生食500mL	1	本 / body		●	●	●											
	点滴静注	エトポシド注	100	mg / ㎡	60 分	●	●	●											
				/															
	70歳以上は75mg/㎡へ減量																		
	100mgあたり、250mLの生食または5%ブドウ糖液に混和する																		
4	主ルート	生食500mL	1	本 / body		●	●	●	●	●									
	精密持続静注	キロサイド注	80	mg / ㎡	24 時間	●	●	●	●	●									
				/															
5	主ルート	生食50mL	1	本 / body	5 分						●								
	点滴静注																		
	キロサイドフラッシュ用																		

【投与上の注意】

エトポシド:DEHPフリー点滴セット使用。

キロサイド:大量投与時、結膜炎予防ためのステロイド点眼を行う。例えば0.1%フルメトロン点眼、1日3回、両眼、キロサイド投与前日から投与終了の翌日まで。