

レジメン登録フォーマット

申請年月日			使用開始日			
登録診療科	血液内科		申請医師	化学療法委員会承認年月		平成 年 月
レジメン名	高齢者AML(Ⅱ)地固め3					
疾患名	急性骨髄性白血病		適応の備考	65歳以上		
適応分類	地固め療法		このコース終了後に血小板数が10万/ μ Lに回復次第、「高齢者AML(Ⅱ)地固め3後 髄注」レジメンを行う。			
1コース日数	14 日間		総コース数	2 コース		催吐性リスク 最少度
抗がん剤投与量・投与日 キロサイド80mg/m ² day1-5、アクリチン注14mg/m ² day1-5						
治療スケジュール・投与日程（投与日は●） (day)						

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	30分	●																	
	点滴静注		/																			
ルートキープ用																						
2	側管	生食100mL	1 本 / body		●	●	●	●	●													
	点滴静注	アクリチン注	14 mg / m ²	30分	●	●	●	●	●													
70歳以上は10mg/m ² へ減量																						
3	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●	●	●	●	●													
	精密持続静注	キロサイド注	80 mg / m ²	24時間	●	●	●	●	●													
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5分					●													
	点滴静注		/																			
キロサイドフラッシュ用																						

【投与上の注意】
 キロサイド: 大量投与時、結膜炎予防のためのステロイド点眼を行う。例えば0.1%フルメロン点眼、1日3回、両眼、キロサイド投与前日から投与終了の翌日まで。