

レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成30年12月28日		使用開始日			
登録診療科	血液内科		申請医師	松永 一美	化学療法委員会承認年月	平成 31年 1月
レジメン名	AspaMetDex(70歳未満)					
疾患名	悪性リンパ腫(NK/T)		適応の備考	再発又は難治性		
適応分類						
1コース日数	21	日間	総コース数	3 (responder患者 6コース可)	コース	催吐性リスク day1:中等度、day2.4.6.8:最小度
抗がん剤投与量・投与日	メトレキセート 3000mg/m ² day1、ロイナーゼ6000単位/m ² day2.4.6.8 デキサート注33mg(6.6mg×5A)day1-4					

治療スケジュール・投与日程(投与日は●) (day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
1	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																												
	点滴静注	プロイメント注150mg	1 本 / body	30分	●																												
2	主ルート	グラニセトン注ハック1mg/50mL	1 本 / body	30分	●																												
	点滴静注	デキサート注6.6mg	5 本 / body		●																												
3	主ルート	生食500mL	0.6 本 / body		●																												
	点滴静注	メトレキセート注	3000 mg / m ²	3時間	●																												
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body	30分	●	●	●																										
	点滴静注	デキサート注6.6mg	5 本 / body		●	●	●																										
5	主ルート	生食50mL	1 本 / body		●	●	●																										
	点滴静注	ロイコボリン注	15 mg / body	5分	●	●	●																										
		メトレキセート投与開始36時間後より、6時間毎計8回投与。																															
6	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5分						●		●																					
	点滴静注																																
7	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●	●	●					●																					
	点滴静注	ロイナーゼ注 注射用水20mL	6000 単位 / m ² 1 本 / body	2時間	●	●	●					●																					
8	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5分	●	●	●				●		●																				
	点滴静注																																

【投与上の注意】

- 70歳以上の患者は、メトレキセート注2000mg/m²、デキサメタゾン20mg/日×4日間に減量が必要。
- ・プロイメントは血管痛が報告されているため、溶解には可能な限り生食250mLを使用すること(最低でも100mL以上)。
- ・プロイメントは抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴すること。
- ・ロイナーゼ注は筋注でも可。
- ・デキサート注はデカドロン錠40mg(分2朝・昼食後)に変更可