

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日	
登録診療科	血液内科	申請医師	化学療法委員会承認年月 平成 年 月
レジメン名	CHASE		
疾患名	非ホジキンリンパ腫	適応の備考	閉鎖式
適応分類			
1コース日数	21 日間	総コース数	4 コース 催吐性リスク 中等度
抗がん剤投与量・投与日	エンドキサン1200mg/m <sup>2</sup> day1、キロサイド2000mg/m <sup>2</sup> day2-3、エトポシド100mg/m <sup>2</sup> day1-3、デキサート注33mg/body day1-3		

治療スケジュール・投与日程（投与日は●） (day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	グラニセロン注ハック1mg/50mL	1 本 / body	30 分	●	●	●																		
	点滴静注		/	/																					
2	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●																				
	点滴静注	エンドキサン注 閉鎖式システム使用	1200 mg / m <sup>2</sup>	2 時間	●																				
3	主ルート	生食500mL	1 本 / body			●	●																		
	点滴静注	キロサイド注	2000 mg / m <sup>2</sup>	3 時間		●	●																		
4	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●	●	●																		
	点滴静注	エトポシド注	100 mg / m <sup>2</sup>	1 時間	●	●	●																		
100mg当たり、250mLの生食または5%ブドウ糖液に混和する。																									
5	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●	●	●																		
	点滴静注		/	/																					
6	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●	●	●																		
	点滴静注	デキサート注6.6mg	5 A / body	1 時間																					

【投与上の注意】

エトポシド: DEHPフリー点滴セット使用。

キロサイド: 大量投与時、結膜炎予防のためのステロイド点眼を行う。例えば0.1%フルメロン点眼、1日3回、両眼、キロサイド投与前日から投与終了の翌日まで。