

レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成30年5月14日	使用開始日	
登録診療科	血液内科	申請医師	上田 周二
レジメン名	R-VcCAP		
疾患名	マントル細胞リンパ腫		
適応分類		適応の備考	
1コース日数	21 日間	総コース数	8 コース
抗がん剤投与量・投与日	リツキシマブ375mg/m ² day1、ベルケイド1.3mg/m ² day2,5,9,12、エンドキサン750mg/m ² day2、ドキシソルピシン50mg/m ² day2、プレドニン錠100mg/body day2-6		
治療スケジュール・投与日程（投与日は●）	(day)		

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	主ルート	生食	337.5 mL / m ²		●																					
	点滴静注	リツキシマブ注	375 mg / m ²	下記	●																					
		10倍に希釈する。																								
2	主ルート	グラニセトン注ハック	1 mg / 50mL	15 分	●																					
	点滴静注																									
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分				●				●				●										
	点滴静注																									
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body		●			●				●				●										
	点滴静注	ベルケイド注	1.3 mg / m ²	30 分	●			●				●				●										
5	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●																					
	点滴静注	エンドキサン注 閉鎖式システム使用	750 mg / m ²	2 時間	●																					
6	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●																					
	点滴静注	ドキシソルピシン注	50 mg / m ²	30 分	●																					
		総投与量は500mg/m ² まで。																								
7	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●	●		●				●				●										
	点滴静注																									
8	経口投与	ポララミン錠2mg	1-3 錠 / body		●																					
	経口投与	ジクロフェナクNa錠25mg	1 錠 / body		●																					
		リツキシマブ投与の30分前																								
9	経口投与	プレドニン錠5mg	20 錠 / body			●	●	●	●	●																
	医師の指示通り																									

【投与上の注意】

- ・プレドニン錠を服用するので、中等度催吐性に基づくデキサメタゾンの投与はしないこととする。
- リツキシマブ：前投薬としてポララミン(2)1~3錠、ジクロフェナクNa(25)1錠を内服する。
- リツキシマブ：初回はECGモニターをつける。
- リツキシマブ：投与速度は初回は25mL/h×1h、100mL/h×1h、残りは200mL/hとする。
- リツキシマブ：2回目以降はinfusion reaction が初回になければ100mL/h×1h、残りは200mL/hとする。