

レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成30年5月14日	使用開始日	
登録診療科	血液内科	申請医師	上田 周二
レジメン名	R-FN(経口)		
疾患名	非ホジキンリンパ腫	適応の備考	CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫
適応分類			
1コース日数	28 日間	総コース数	8 コース
抗がん剤投与量・投与日		リツキシマブ375mg/m ² day1、ノバントロン10mg/m ² day2、フルダラ錠40mg/m ² day2-4	
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)		(day)	

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	主ルート	生食500mL	0.675 本 / m ²		●																											
	点滴静注	リツキシマブ注	375 mg / m ²	下記	●																											
		10倍に希釈する。																														
2	主ルート	グラニセトン注バッグ1mg/50mL	1 本 / body	30 分	●																											
	点滴静注		/	/																												
3	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●																											
	点滴静注	ノバントロン注	10 mg / m ²	30 分	●																											
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●	●																										
	点滴静注		/	/																												
5	経口投与	フルダラ錠10mg	40 mg / m ²			●	●	●																								
	医師の指示通り																															
6	経口投与	ポララミン錠2mg	1-3 錠 / body		●																											
	経口投与	ジクロフェナクNa錠25mg	1 錠 / body		●																											
		リツキシマブ投与の30分前																														

【投与上の注意】

- ・day2のデキサート注は、3.3mgでもよい。
- リツキシマブ：前投薬としてポララミン(2)1~3錠、ジクロフェナクNa(25)1錠を内服する。
- リツキシマブ：初回はECGモニターをつける。
- リツキシマブ：投与速度は初回は25mL/h×1h、100mL/h×1h、残りは200mL/hとする。
- リツキシマブ：2回目以降はinfusion reaction が初回になれば100mL/h×1h、残りは200mL/hとする。