

レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成30年5月11日	使用開始日	
登録診療科	血液内科	申請医師	松永一美
レジメン名	BDR寛解導入療法		
疾患名	原発性マクログロブリン血症	適応の備考	
適応分類	寛解導入療法		
1コース日数	21 日間	総コース数	4 コース
			催吐性リスク 最少度

抗がん剤投与量・投与日 | ベルケイド1.3mg/m² day1,4,8,11, リツキシマブ375mg/m² day11
 治療スケジュール・投与日程(投与日は●) (day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	30 分	●			●				●			●																		
	点滴静注	デキサート6.6mg	6 本 / body		●			●				●			●																		
2	主ルート	生食50mL	1 本 / body	15 分	●			●				●			●																		
	点滴静注	ベルケイド注	1.3 mg / m ²		●			●				●			●																		
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●			●				●			●																		
	点滴静注																																
4	主ルート	生食500mL	0.675 本 / m ²	下記											●																		
	点滴静注	リツキシマブ	375 mg / m ²												●																		
5	主ルート	生食50mL	1 本 / body												●																		
	点滴静注																																
6	経口投与	ポララミン錠2mg	1-3 錠 / body												●																		
		ジクロフェナクNa錠25mg	1 錠 / body												●																		
		リツキシマブ投与の30分前																															

【投与上の注意】
 ■リツキシマブ: 前投薬としてポララミン(2)1~3錠、ボルタレン(25)1錠を内服する。
 リツキシマブ: 初回はECGモニターをつける。
 ■リツキシマブ: 投与速度は初回は25mL/h×1h、100mL/h×1h、残りは200mL/hとする。
 ■リツキシマブ: 2回目以降はinfusion reaction が初回になれば100mL/h×1h、残りは200mL/hとする。