レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成30年5月14日	使用開始日			
登録診療科	血液内科	申請医師	上田　周二	化学療法委員会承認年月	平成　30 年　6 月
レジメン名	リツキシマブ				
疾患名	非ホジキンリンパ腫	適応の備考	CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫 リツキシマブ投与を繰り返す場合は、原則7日間以上あけて投与すること。 他の化学療法との併用可能。		
適応分類	進行再発、寛解導入、地固め、維持・強化、救援				
1コース日数	7　日間	総コース数	有効な限り　コース	催吐性リスク	最少度
抗がん剤投与量・投与日	リツキシマブ375mg/㎡　day1				

治療スケジュール　・　投 与 日 程（ 投 与 日 は ● ）　(day)

投与順	ﾙｰﾄ・方法	薬　剤　名	投　与　量		投与時間	1	2	3	4	5	6	7
1	主ルート	生食500mL	0.675	本　／　㎡		●						
	点滴静注	リツキシマブ注	375	mg　／　㎡	下記	●						
				／								
	10倍に希釈する。											
2	主ルート	生食50mL	1	本　／　body	5　分	●						
	点滴静注			／								
				／								
3		ポララミン錠2mg	1-3	錠　／　body		●						
	経口投与	ジクロフェナクNa錠25mg	1	錠　／　body		●						
				／								
	リツキシマブ投与の30分前											

【投与上の注意】
リツキシマブ：前投薬としてポララミン（2）1～3錠、ジクロフェナクNa(25)1錠を内服する。
リツキシマブ：初回はECGモニターをつける。
リツキシマブ：投与速度は初回は25mL/h×1h、100mL/h×1h、残りは200mL/hとする。
リツキシマブ：2回目以降はinfusion reaction　が初回になければ100mL/h×1h、残りは200mL/hとする。