

レジメン登録フォーマット

| | | | |
|----------------------|---|-------|----------------|
| 申請年月日 | 平成30年8月24日 | 使用開始日 | |
| 登録診療科 | 血液内科 | 申請医師 | 松永 一美 |
| レジメン名 | G-ベンダムスチン(1コース目) | | |
| 疾患名 | 濾胞性リンパ腫 | 適応の備考 | CD20陽性の濾胞性リンパ腫 |
| 適応分類 | 進行・再発、寛解導入 | | |
| 1コース日数 | 28 日間 | 総コース数 | 1 コース |
| 抗がん剤投与量・投与日 | ガザイバ1000mg/body day1,8,15、ベンダムスチン(トリアキシン)90mg/m ² day2-3 | | |
| 治療スケジュール・投与日程(投与日は●) | (day) | | |

| 投与順 | ルート・方法 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|--------|--------------------|------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 主ルート | 生食100mL | 1 本 / body | 30 分 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | 水溶性プレドニン注50mg | 2 A / body | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 主ルート | 生食250mL | 1 本 / body | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | ガザイバ注 | 1000 mg / body | 下記 | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 主ルート | グラニセロン注バッグ1mg/50mL | 1 本 / body | 30 分 | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 主ルート | 生食50mL | 1 本 / body | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | トリアキシン注 | 90 mg / m ² | 10 分 | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【減量基準】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前コースの投与量 120mg/m ² → 90mg/m ² で再開 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90mg/m ² → 60mg/m ² で再開 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60mg/m ² → 中止を検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| なお、減量後は再増量しないこと。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 主ルート | 生食50mL | 1 本 / body | 5 分 | ● | ● | ● | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | なし | ポララミン錠2mg | 1-3 錠 / body | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| | — | ジクロフェナク錠25mg | 1 錠 / body | | | ● | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| ガザイバ投与の30分前 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【投与上の注意】

・中等度催吐性用のデキサートは不要。

トリアキシン:希釈は生食のみ。

ガザイバ:0.2または0.22μmのインラインフィルターを使用して投与する。

ガザイバ:前投薬としてポララミン(2)1~3錠、ジクロフェナク(25)1錠を内服する。前投薬のプレドニン注の代わりに内服投与する場合は、プレドニン錠(5)20錠を別にオーダーする。

ガザイバ:投与速度は初回は12.5mL/h×30分、25mL/h×30分、37.5mL/h×30分、50mL/h×30分、62.5mL/h×30分、75mL/h×30分、87.5mL/h×30分、残りは100mL/hとする。

ガザイバ:2回目以降はGrade2以上のinfusion reactionが発現しなかった場合、25mL/h×30分、50mL/h×30分、75mL/h×30分、残りは100mL/hとする。

ガザイバ:総液量250mLに調製。