レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成30年8月24日	使用開始日			
登録診療科	血液内科	申請医師	松永　一美	化学療法委員会承認年月	平成　31 年　2 月
レジメン名	ガザイバ維持療法(2年間投与)				
疾患名	濾胞性リンパ腫	適応の備考	CD20陽性の濾胞性リンパ腫		
適応分類	進行再発、寛解導入、地固め、維持・強化、救援				
1コース日数	2ヶ月	総コース数	有効な限り　コース	催吐性リスク	最少度
抗がん剤投与量・投与日	ガザイバ1000mg/body　day1				

治療スケジュール　・　投 与 日 程 (投 与 日 は ●)　(day)

投与順	ルート・方法	薬　剤　名	投　与　量		投与時間	1	2	3	4	5	6	7	～	2ヶ月
1	主ルート	生食100mL	1	本 / body	30　分	●								
	点滴静注	水溶性プレドニン注50mg	2	A / body		●								
				/										
2	主ルート	生食250mL	1	本 / body		●								
	点滴静注	ガザイバ注	1000	mg / body	下記	●								
				/										
3	主ルート	生食50mL	1	本 / body	5　分	●								
	点滴静注			/										
				/										
4		ポララミン錠2mg	1-3	錠 / body		●								
	経口投与	ジクロフェナク錠25mg	1	錠 / body		●								
	ガザイバ投与の30分前													

【投与上の注意】

ガザイバ:0．2または0．22μmのインラインフィルターを使用して投与する。

ガザイバ:前投薬としてポララミン(2)1～3錠、ジクロフェナク(25)1錠を内服する。前投薬のプレドニン注の代わりに内服投与する場合は、プレドニン錠(5)20錠を別にオーダする。

ガザイバ:投与速度は25mL/h×30分より開始。以降50mL×30分、75mL/h×30分、残りは100mL/hとする。(前回投与時にGrade2以上のinfusion　reactionが発現しなかった場合)

ガザイバ:総液量250mLに調製。