レジメン登録フォーマット

申請年月日				使用開	始日																											
登録診療科		血液内科		申請医	師					化	学療	法多	5員:	会承	認	年月		平	成		年	J	1									
レジメン名		CA(キロサイド皮下注)	<u>.</u>																													
登録診療科 レジメン名 疾患名 適応分類 1コース日数		骨髄異形性症候群	適応の備考																													
1コース日数		14	ス数	コース 催吐性リスク 最少度																												
抗がん	·剤投与量·	·投与日 キロサイド10gmg/m²×2	day1-	14、アク	フラシノ	ン14mg	g∕mื	day	/1-4																							
治療スケジュール ・ 投 与 日 程(投 与 日 は ●) (day)																																
投与順	ルート・方法	薬剤名	找	足与量		投与時	間	1 2	3	4	5	6 7	7 8	9	10	11	12	13	14													
1	なし	キロサイド注	10	mg /	′ m [‡]			• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•													
	皮下注射			/	,												[I				[]				
				/	′																							[]				
	12時間毎	に皮下注																														
2	なし	キロサイド注	10	mg /	′ m [‡]		(• •	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•					 	 <u> </u>	l		[]	J			
	皮下注射			/	′				<u> </u>		ll	∐		<u></u>	l	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	[]				 1	 <u> </u>	l	<u> </u>	اا	J			
				/	,						<u> </u>			<u> </u>				 	 <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>									
		時間毎に皮下注																											ш	لــــا		
3	主ルート	生食50mL	1	本 /	body	5 :	分(• •	•	•	ļļ			ļ	ļ	<u> </u>	.	ļ	<u> </u>	ļ				 	 	 	ļ	<u> </u>				
	点滴静注			/	, 						ļļ			ļ	ļ	ļ	.	ļ		ļ				 	 	ļ	ļ	<u> </u>		ļ		
	W/1011171			/	,						ļļ	↓			ļ	<u> </u>	.	ļ	<u> </u>	ļ				 	 	 	ļ	ļJ				
																												Ш	ш	\longrightarrow		
4	主ルート	生食100mL	1	本 /	body			• •	•	•	ļļ			ļ	ļ	ļ	.	ļ		ļ				 	 	 	ļ!	ļl		ļ		
	点滴静注	アクラシノン注	14	mg /	′ m*	30	分 (• •	•	•	ļļ			ļ	ļ	ļ	.	ļ		ļ				 	 	ļ	ļ <u>'</u>	ļl		ı		
				/	, 						ļļ			ļ	ļ	ļ	.	ļ		ļ				 	 	 	ļ!	ļl		ļ		
		歳以上では10mg/m/日に減量する																									<u> </u>	Ш	ш	igsquare		
5	主ルート	生食50mL	1	本 /	body	5 :	分(• •	•	•	ļļ				ļ	ļ	.	ļ	 	ļ				 	 	 	ļ <u>.</u>	ļl		ļ		
	点滴静注			/	,					ļļ	ļļ			ļ	ļ		 	ļ		ļl				 	 	 	ļ <u>!</u>	ļ				
			l	/		l				ļļ	ļ <u>ļ</u>			ļ	ļ		.	 		ļļ				 	 	ļ	ļ!					
									1					1	l	1	l	l	1						l	l	1	1 !	, !			

【投与上の注意】

G-CSFを併用しても良い。(CAG療法) 血小板減少などの出血傾向が認められる場合は、キロサイド皮下注を持続静注の「CA(キロサイド持続静注)」レジメンに変更する。(持続静注の場合は、20mg/m²/日 day1-14を標準とする)