レジメン登録フォーマット

申請年月日	2021.7.20	使用開始日			
登録診療科	血液内科	申請医師	上田周二	化学療法委員会承認年月	年　月
レジメン名	DBd（4～8コース目）【計5回】（皮下注）				
疾患名	多発性骨髄腫	適応の備考			
適応分類	地固め療法				
1コース日数	21　日間	総コース数	5　コース	催吐性リスク	最少度
抗がん剤投与量・投与日	ボルテゾミブ1.3mg/㎡　day1.4.8.11、ダラキューロ配合皮下注1800mg/body day1、デキサメタゾン day1.2.4.5.8.9.11.12				

治療スケジュール　・　投与日程（投与日は●）　（day）

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量		投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	なし			/																						
	皮下注射	ダラキューロ配合皮下注	1800	mg / body	3～5分	●																				
				/																						
	20mLシリンジで払い出す																									
2	なし	生食50mL	1	本 / body		●			●				●			●										
	皮下注射	ボルテゾミブ注	1.3	mg / ㎡		●			●				●			●										
				/																						
	1Vあたり生食1.2mLで溶解																									
				/																						
	経口投与	デキサメタゾン錠	20	mg / body		●	●		●	●			●	●		●	●									
		1日1回		/																						
	ダラキューロ配合皮下注投与日は ダラキューロ配合皮下注投与の1～3時間前																									
		ポララミン錠2mg	1	錠 / body		●																				
	経口投与	ジクロフェナクNa錠25mg	1	錠 / body		●																				
				/																						
	ダラキューロ配合皮下注投与の1～3時間前																									

【投与上の注意】

ダラキューロ配合皮下注：前投薬としてポララミン（2）1錠、ジクロフェナクNa(25)1錠を内服する。

ダラキューロ配合皮下注：臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に、15mLを3～5分かけて投与。（他の部位への投与はデータが得られていない）

ボルテゾミブ（皮下注）：1Vあたり生食1.2mLで溶解（ボルテゾミブ最終濃度：2.5mg/mL）

ボルテゾミブ（皮下注）：繰り返し皮下投与する場合には、左右の大腿部、腹部等に交互に投与するなど同一注射部位を避けること。

デキサメタゾン：20mg/日内服day1.2.4.5.8.9.11.12