

レジメン登録フォーマット

申請年月日	2021.7.20	使用開始日	
登録診療科	血液内科	申請医師	上田周二
レジメン名	DLd(7コース目以降)(ダラキューロ皮下注)		
疾患名	多発性骨髄腫	適応の備考	
適応分類	地固め療法		
1コース日数	28	日間	総コース数
抗がん剤投与量・投与日		有効な限り	コース
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)		催吐性リスク	最少度
ダラキューロ配合皮下注1800mg/body day1、レブラミド25mg/body day1-day21、デキサメタゾン20mg/body day1.2、デキサメタゾン40mg/body day8.15.22			

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	なし																															
	皮下注射	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg / body	3~5分	●																											
20mLシリンジで払い出す																																
	経口投与	レブラミドカプセル5mg 1日1回	25 mg / body		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
	経口投与	デキサメタゾン錠 1日1回	20 mg / body		●	●																										
ダラキューロ配合皮下注投与日でデキサート投与のない日は、ダラキューロ配合皮下注投与の1~3時間前																																
	経口投与	デキサメタゾン錠 1日1回	40 mg / body									●								●						●						
	経口投与	ボラミン錠2mg ジクロフェナクNa錠25mg	1 錠 / body 1 錠 / body		●	●																										
ダラキューロ配合皮下注投与の1~3時間前																																

【投与上の注意】

ダラキューロ配合皮下注: 前投薬としてボラミン(2)1錠、ジクロフェナクNa(25)1錠を内服する。
 ダラキューロ配合皮下注: 臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に、15mLを3~5分かけて投与。(他の部位への投与はデータが得られていない)
 デキサメタゾン: 20mg/日内服day1.2
 デキサメタゾン: 40mg/日内服day8.15.22