

レジメン登録フォーマット

申請年月日	2021.7.20	使用開始日	
登録診療科	血液内科	申請医師	松永一美
レジメン名	DCd(1コース目)(76歳未満)【計1回】(ダラキューロ皮下注)		
疾患名	多発性骨髄腫	適応の備考	デキサメタゾン: 40mg/body day22
適応分類	進行・再発		
1コース日数	28	日間	総コース数
抗がん剤投与量・投与日		ダラキューロ配合皮下注1800mg/body day1.8.15.22、カイプロリス20mg/m ² day1.2、56mg/m ² day8.9.15.16、プレドニン錠: 20mg/body day3、デキサメタゾン: 40mg/body day22	
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)			

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	30 分	●	●																										
	点滴静注	デキサート6.6mg	3 本 / body		●	●														●	●											
2	なし																															
	皮下注射	ダラキューロ配合皮下注	1800 mg / body	3~5分	●								●																			
20mLシリンジで払い出す																																
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●								●																			
	点滴静注																			●												
4	主ルート	5%ブドウ糖液100mL	1 本 / body		●	●																										
	点滴静注	カイプロリス 注射用水100mL	20 mg / m ² 1 本 / body	30 分	●	●																										
IVあたり10mg製剤は5mL、40mg製剤は20mLの注射用水で溶解後、5%ブドウ糖液100mLで希釈する																																
5	主ルート	5%ブドウ糖液100mL	1 本 / body										●	●																		
	点滴静注	カイプロリス 注射用水100mL	56 mg / m ² 1 本 / body	30 分									●	●						●	●											
IVあたり10mg製剤は5mL、40mg製剤は20mLの注射用水で溶解後、5%ブドウ糖液100mLで希釈する																																
6	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●	●							●	●																		
	点滴静注																			●	●											
	経口投与	プレドニン錠 1日1回	20 mg / body						●																							
	経口投与	デキサメタゾン錠 1日1回	40 mg / body																													
ダラキューロ配合皮下注投与の1~3時間前																																
	経口投与	ボラミン錠2mg ジクロフェナクNa錠25mg	1 錠 / body 1 錠 / body		●								●							●												
	経口投与				●								●							●												
ダラキューロ配合皮下注投与の1~3時間前																																

【投与上の注意】

ダラキューロ配合皮下注: 前投薬としてボラミン(2)1錠、ジクロフェナクNa(25)1錠を内服する。
 ダラキューロ配合皮下注: 臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に、15mLを3~5分かけて投与。(他の部位への投与はデータが得られていない)
 カイプロリス: 体表面積が2.2m²を超える場合は2.2m²として計算する
 デキサメタゾン: 40mg/日内服day22