

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日			
登録診療科	内科	申請医師		化学療法委員会承認年月	平成 26年 3月
レジメン名	レミケード(関節リウマチ)(2コース目以降)				
疾患名	関節リウマチ	適応の備考	導入時、2週、6週に投与。以後は8週毎だが、活動性によって投与間隔を4週まで短縮できる。 (8週間隔であれば、最大10mg/kgまで増量可。投与間隔短縮時は、最大6mg/kgまで増量可。)		
1コース日数	56 日間	総コース数	コース	催吐性リスク	なし

抗がん剤投与量・投与日 ||レミケード3~10mg/kg day1

治療スケジュール・投与日程(投与日は●) (day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	~	14	~	28	~	35	~	42	~	49	~	56																										
1	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																																						
	点滴静注	レミケード注	9999 mg / kg	2 時間	●																																						
			リウマチの活動性により3mg/kg~10mg/kgで投与する (初回~3投目までは3mg/kg)																																								

【投与上の注意】

- 3回目まで投与時反応がなければ1時間に短縮して投与できる。(ただし、平均点滴速度は、1時間当たり5mg/kgを投与する速度を超えないこと)
- 1.2ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること。
- 他の注射剤、輸液と混合しないこと。
- メントレキサート製剤による治療と併用する。