

レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成18年6月13日	使用開始日			
登録診療科	脳神経外科	申請医師	榊	化学療法委員会承認年月	平成 年 月
レジメン名	ICE(ホスアプレビタント)【5コース】				
疾患名	髄芽腫・胚芽腫	適応の備考	総コース数:5コース(1・5・9・13・17週に投与)		
適応分類	寛解導入療法				
1コース日数	28	日間	総コース数	5	コース 催吐性リスク 高度
抗がん剤投与量・投与日	イホマイド900mg/m ² day1-5、シスプラチン20mg/m ² day1-5、エトポシド60mg/m ² day1-5				

治療スケジュール・投与日程(投与日は●)		(day)																														
投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	主ルート	ソルアセトF500mL	4 本 / body	24 時間	●	●	●	●	●																							
	点滴静注		/																													
8:00-14:00、14:00-20:00、20:00-2:00、2:00-8:00																																
2	側管①	生食250mL	1 本 / body		●																											
	点滴静注	ホスアプレビタント注150mg	1 本 / body	30 分	●																											
9:00-9:30																																
3	側管①	ハロセトン注ハッグ0.75mg	1 本 / body		●																											
	点滴静注	デキサート注6.6mg デキサート注1.65mg	1 本 / body 2 本 / body	30 分	●																											
9:30-10:00																																
4	側管①	生食50mL	1 本 / body		●				●																							
	点滴静注	デキサート注6.6mg	1 本 / body	30 分	●				●																							
9:30-10:00																																
5	側管①	生食50mL	1 本 / body					●	●																							
	点滴静注	デキサート注6.6mg	2 本 / body	30 分				●	●																							
9:30-10:00																																
6	側管①	生食500mL	1 本 / body		●	●	●	●	●																							
	点滴静注	シスプラチン注	20 mg / m ²	2 時間	●	●	●	●	●																							
10:00-12:00 シスプラチンと同量の生食を抜いてから混注する																																
7	側管②	生食50mL	1 本 / body		●	●	●	●	●																							
	点滴静注	ウロミテキサン注	270 mg / m ²	30 分	●	●	●	●	●																							
12:00-12:30																																
8	側管①	生食500mL	1 本 / body		●	●	●	●	●																							
	点滴静注	イホマイド注	900 mg / m ²	2 時間	●	●	●	●	●																							
12:00-14:00																																
9	側管①	生食500mL	1 本 / body		●	●	●	●	●																							
	点滴静注	エトポシド注	60 mg / m ²	2 時間	●	●	●	●	●																							
14:00-16:00																																
10	側管②	生食50mL	1 本 / body		●	●	●	●	●																							
	点滴静注	ウロミテキサン注	270 mg / m ²	30 分	●	●	●	●	●																							
16:00-16:30																																
11	側管②	生食50mL	1 本 / body		●	●	●	●	●																							
	点滴静注	ウロミテキサン注	270 mg / m ²	30 分	●	●	●	●	●																							
20:00-20:30																																
12	主ルート	生食100mL	1 本 / body						●	●	●																					
	点滴静注	デキサート注6.6mg	1 本 / body	30 分					●	●	●																					
9:30-10:00																																

【投与上の注意】

- ・ホスアプレビタントは血管痛が報告されているため、溶解には可能な限り生食250mLを使用すること(最低でも100mL以上)。
- ・ホスアプレビタントは抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴すること。
- ・ホスアプレビタントの次に5-HT3受容体拮抗薬+デキサート注を投与して、その次に抗がん剤を投与すること。
- イホマイド: 出血性膀胱炎、膀胱障害の予防のためウロミテキサンを併用すること
- エトポシド: DEHPフリー点滴セット使用。
- シスプラチン: 希釈は生食のみ。
- シスプラチン: 腎毒性軽減のためhydrationが必要。