レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日			
登録診療科	泌尿器科	申請医師		化学療法委員会承認年月	平成　26 年　10 月
レジメン名	カバジタキセル				
疾患名	前立腺がん	適応の備考	プレドニン錠(5mg)2T 分2 を併用		
適応分類	進行・再発				
1コース日数	21　日間	総コース数	有効な限り　コース	催吐性リスク	軽度
抗がん剤投与量・投与日	ジェブタナ25mg/㎡　day1				

治療スケジュール　・　投 与 日 程 (投 与 日 は ●)　(day)

投与順	ルート・方法	薬 剤 名	投 与 量		投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	生食50mL	1	本 / body		●																				
	点滴静注	デキサート注6.6mg	1	本 / body	30 分	●																				
		ファモチジン注20mg	1	本 / body		●																				
2	主ルート	生食250mL	1	本 / body		●																				
	点滴静注	ジェブタナ注	25	mg / ㎡	60 分	●																				
				/																						
3	主ルート	生食50mL	1	本 / body	5 分	●																				
	点滴静注			/																						
				/																						

【投与上の注意】
前投薬としてレスタミン5錠の内服、デキサート注、ファモチジン20mg静注が必要。
アルコール不耐症がないことを確認する。
投与時はインラインフィルター(0.2または0.22μm)を使用すること。
DEHPフリー(フィルターつき)の輸液ルートを使用。
プレドニン錠(5mg)2T 分2 を併用