レジメン登録フォーマット

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申請年月日 | 平成25年12月1日 | 使用開始日 | | | |
| 登録診療科 | 泌尿器科 | 申請医師 | | 化学療法委員会承認年月 | 平成　26 年　1 月 |
| **レジメン名** | カルセド(前立腺がん(小細胞がん)) | | | | |
| 疾患名 | 前立腺がん(小細胞がん) | 適応の備考 | 前立腺がんのうちの小細胞がん | | |
| 適応分類 | 進行・再発 | | | | |
| 1コース日数 | 21　日間 | 総コース数 | 有効な限り　コース | 催吐性リスク | 中等度 |
| 抗がん剤投与量・投与日 | カルセド40mg/㎡　day1-3 | | | | |

治療スケジュール　・　投与日程（投与日は●）　(day)

| 投与順 | ルート・方法 | 薬剤名 | 投与量 | | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主ルート | グラニセトロン注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL | 1 | 本 / body | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | デキサート注6.6mg | 1 | 本 / body | 30 分 | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | デキサート注1.65mg | 2 | 本 / body | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 主ルート | 生食50mL | 1 | 本 / body | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | カルセド注 | 40 | mg / ㎡ | 5 分 | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 主ルート | 生食50mL | 1 | 本 / body | 5 分 | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【投与上の注意】
・day1-3のデキサート注は、6.6mgでもよい。
カルセド：溶解後の安定性は3時間。