

レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成23年11月7日		使用開始日					
登録診療科	泌尿器科		申請医師	化学療法委員会承認年月		平成	年	月
レジメン名	トーリセル							
疾患名	腎がん		適応の備考					
適応分類	進行・再発		適応の備考					
1コース日数	7	日間	総コース数	有効な限り	コース	催吐性リスク	最少度	
抗がん剤投与量・投与日	トーリセル25mg/body day1							
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)	(day)							

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7													
1	主ルート	生食250mL	1	本 / body	60分	●																		
	点滴静注	トーリセル注	25	mg / body	60分	●																		
2	主ルート	生食50mL	1	本 / body	5分	●																		
	点滴静注																							
3		レスタミンコーワ錠10mg	5	錠 / body		●																		
	経口投与																							
	トーリセル投与の30分前																							

- 【投与上の注意】  
トーリセル(限): infusion reaction を予防するためレスタミン5錠の前投薬は必要。  
トーリセル(限): DEHPフリー(フィルターつき)の輸液ルートを使用。  
トーリセル(限): 5 $\mu$ m以下のインラインフィルターを使用。
- 【減量基準】  
《間質性肺疾患以外の場合》  
Grade3以上: 3週間以内に回復が認められて再投与する場合は、投与を1レベル減量すること。  
[減量レベル] 25→20→15→10mg/body (なお減量後は再増量しないこと)
- 《間質性肺疾患の場合》  
休薬あるいは投与を中止する(添付文書参照)