レジメン登録フォーマット

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申請年月日 | 平成30年1月18日 | 使用開始日 | | | |
| 登録診療科 | 泌尿器科 | 申請医師 | 岸川 英史 | 化学療法委員会承認年月 | 平成 31 年 2 月 |
| **レジメン名** | リツキサン[100mg](腎移植患者用) | | | | |
| 疾患名 | 腎移植患者用 | 適応の備考 | | | |
| 適応分類 | | | | | |
| 1コース日数 | 7 日間 | 総コース数 | 2 コース | 催吐性リスク | 最少度 |
| 抗がん剤投与量・投与日 | リツキサン100mg/body day1 | | | | |

治療スケジュール ・ 投 与 日 程 ( 投 与 日 は ● ) (day)

| 投与順 | ﾙｰﾄ・方法 | 薬 剤 名 | 投 与 量 | | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主ルート | 生食100mL | 0.9 | 本 / body | | ● | | | | | | |
| | 点滴静注 | リツキサン注 | 100 | mg / body | 下記 | ● | | | | | | |
| | (投与速度は初回は25mg/h×1h、100mg/h×1h、残りは200mg/hとする。2回目以降はinfusion reaction が初回になければ100mg/h×1h、残りは200mg/hとする。) | | | | | | | | | | | |
| | 10倍希釈する 生食10mL抜く | | | | | | | | | | | |
| 2 | 主ルート | 生食50mL | 1 | 本 / body | 5 分 | ● | | | | | | |
| | 点滴静注 | | | / | | | | | | | | |
| | | | | / | | | | | | | | |
| 3 | 経口投与 | ポララミン錠2mg | 1～3 | 錠 / body | | ● | | | | | | |
| | | ジクロフェナクNa錠25mg | 1 | 錠 / body | | ● | | | | | | |
| | | | | / | | | | | | | | |
| | リツキサン投与の30分前 | | | | | | | | | | | |

【投与上の注意】
リツキサン:前投薬としてポララミン(2)1～3錠、ジクロフェナクNa(25)1錠を内服する。
リツキサン:初回はECGモニターをつける。
リツキサン:投与速度は初回は25mg/h×1h、100mg/h×1h、残りは200mg/hとする。
リツキサン:2回目以降はinfusion reaction が初回になければ100mg/h×1h、残りは200mg/hとする。