

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日	
登録診療科	婦人科	申請医師	化学療法委員会承認年月 平成 年 月
レジメン名	ウィークリーパクリタキセル【初回患者用】		
疾患名	子宮がん・卵巣がん	適応の備考	
適応分類			
1コース日数	28 日間	総コース数	コース 催吐性リスク 軽度
抗がん剤投与量・投与日 パクリタキセル80mg/m ² day1.8.15			

						(day)																											
投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●							●								●													
	点滴静注	デキサート注6.6mg	1 本 / body	30分	●							●								●													
		ファモチジン注20mg	1 本 / body			●						●								●													
2	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●																												
	点滴静注	パクリタキセル注	80 mg / m ²	3時間	●																												
2コース目以降、生食250mLで希釈して1時間で投与する																																	
3	主ルート	生食250mL	1 本 / body									●								●													
	点滴静注	パクリタキセル注	80 mg / m ²	1時間								●								●													
2コース目以降、生食250mLで希釈して1時間で投与する																																	
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5分	●							●								●													
	点滴静注																																
5	レスタミンコーワ錠		5 錠 / body		●							●								●													
	経口投与																																
パクリタキセル投与の30分前																																	

【投与上の注意】

パクリタキセル: 前投薬としてレスタミン5錠の内服、デキサート注、ファモチジン20mg静注が必要。
 パクリタキセル: DEHPフリー(フィルターつき)点滴セット使用。0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを使用し投与すること。
 パクリタキセル: アルコール不耐症がないことを確認する。