

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日		化学療法委員会承認年月	平成 年 月
登録診療科	婦人科	申請医師			
レジメン名	マンスリーDC				
疾患名	子宮がん・卵巣がん				
適応分類		適応の備考			
1コース日数	21 日間	総コース数	コース	催吐性リスク	高度
抗がん剤投与量・投与日 ドセタキセル70mg/m ² day1、カルボプラチン5AUC/body day1					

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	(day)																				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																				
	点滴静注	プロイメント注150mg	1 本 / body	30分	●																				
2	主ルート	アロキシ注パック0.75mg	1 本 / body		●																				
	点滴静注	デキサート注6.6mg	1 本 / body	30分	●																				
		デキサート注1.65mg	2 本 / body		●																				
3	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																				
	点滴静注	ドセタキセル注	70 mg / m ²	60分	●																				
4	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																				
	点滴静注	カルボプラチン注	5 AUC / body	60分	●																				
5	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5分	●																				
	点滴静注																								
6	経口投与	デカドロン錠	8 mg / body			●																			
		分2 朝昼食後																							
7	経口投与	デカドロン錠	16 mg / body				●	●																	
		分2 朝昼食後																							

【投与上の注意】

- ・プロイメントは血管痛が報告されているため、溶解には可能な限り生食250mLを使用すること(最低でも100mL以上)。
- ・プロイメントは抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴すること。
- ・プロイメントの次に5-HT₃受容体拮抗薬+デキサート注を投与して、その次に抗がん剤を投与すること。