レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日			
登録診療科	婦人科	申請医師		化学療法委員会承認年月	平成　　年　　月
レジメン名	メソトレキセート				
疾患名	絨毛性疾患	適応の備考	休薬期間は通常7～12日間だが、前回の投与によって副作用が現れた場合は、副作用が消失するまで休薬すること。		
適応分類					
1コース日数	14　日間	総コース数	6　コース	催吐性リスク	最少度
抗がん剤投与量・投与日	メソトレキセート0.4mg/kg　day1-5				

治療スケジュール　・　投 与 日 程 (投 与 日 は ●)　　(day)

投与順	ﾙｰﾄ・方法	薬　剤　名	投　与　量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	主ルート	生食50mL	1　本　/　body	5　分	●	●	●	●	●									
	点滴静注		/ /															
2	主ルート	生食50mL	1　本　/　body		●	●	●	●	●									
	点滴静注	メソトレキセート注	0.4　mg　/　kg	15　分	●	●	●	●	●									
	最大投与量は20mg/回		/															
3	主ルート	生食50mL	1　本　/　body	5　分	●	●	●	●	●									
	点滴静注		/ /															

【投与上の注意】