レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日	平成27年1月1日		
登録診療科	消化器内科・外科	申請医師		化学療法委員会承認年月	平成　　年　　月
レジメン名	レミケード(クローン病)【4投目以降】				
疾患名	クローン病	適応の備考			
適応分類					
1コース日数	56　日間	総コース数	コース	催吐性リスク	なし
抗がん剤投与量・投与日	レミケード　5mg/kg day1				

治療スケジュール ・ 投 与 日 程 (投 与 日 は ●)　　(day)

投与順	ルート・方法	薬 剤 名	投 与 量	投与時間	1	～	7	～	14	～	21	～	28	～	35	～	42	～	49	～	56
1	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																
	点滴静注	レミケード	5 mg / kg	2時間	●																
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					

※並行して投与する場合は、コメントを入力する。(例:Rp2とRp3を同時に投与開始する。)

【投与上の注意】

6週の投与以降(4投目から)、効果が減弱した場合には1回目の投与量を10mg/kgとすることが可能。

4投目の開始前の休薬期間は56日間。

投与時には、1．2ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること

他の注射剤、輸液と混合しないこと

6週の投与以降、それまでの投与でinfusion reaction　が認められなければ、点滴速度を上げることが可能。但し平均点滴速度は、1時間当たり5mg/kgを投与する速度を超えない。

また、点滴時間を短縮した際に、infusion reactionが認められた場合には、次回以降の投与では、点滴時間を短縮せずに投与する。