レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日	平成27年1月1日		
登録診療科	消化器内科・外科	申請医師		化学療法委員会承認	平成　　年　　月
レジメン名	5－FU＋レボホリナート（sLV5FU2）				
疾患名	大腸がん	適応の備考	CVポート		
適応分類	進行再発、術後補助				
1コース日数	14　日間	総コース数	コース	催吐性リスク	軽度
抗がん剤投与量・投与日	5－FU400mg/㎡day1、2400mg/㎡　day1				

治療スケジュール　・　投与日程（投与日は●）　（day）

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	主ルート	生食20mL	1 本 / body		●													
	中心静脈注射																	
2	主ルート	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL	1 本 / body	30 分	●													
	中心静脈注射	ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg/2mL	1 本 / body		●													
		デキサート注は、3.3mgでも可	/															
3	主ルート	5%ブドウ糖液250mL	1 本 / body	2 時間	●													
	中心静脈注射	レボホリナート	200 mg / ㎡		●													
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●													
	中心静脈注射	5-FU	400 mg / ㎡		●													
		点滴速度：5分																
5	主ルート	生食100mL	1 本 / body	46 時間	●													
	中心静脈注射	5-FU	2400 mg / ㎡		●													
		ｲﾝﾌｭｰｻﾞｰﾎﾟﾝﾌﾟ使用																
	希釈後の液量を100mLとして調製する																	
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		

※並行して投与する場合は、コメントを入力する。（例：Rp2とRp3を同時に投与開始する。）

【投与上の注意】

5-FU注：Rp5）の5-FU注は、インフューザーポンプを使用し投与する。

穿刺時に逆血を確認し、ポートの通過を確認すること。