

レジメン登録フォーマット

申請年月日	2019/11/14	使用開始日	
登録診療科	消化器内科・外科	申請医師	福永
レジメン名	CAPIRI (XELIRI) (3週毎)		
疾患名	大腸がん	適応の備考	UGT1A1遺伝子多型がホモ型、*6/*28のダブルヘテロ型ではイリノテカンの投与量は150mg/m ² とする
適応分類	進行再発		
1コース日数	21 日間	総コース数	有効な限り コース 催吐性リスク 中等度
抗がん剤投与量・投与日 イリノテカン 200mg/m ² day1、カペシタビン 1600mg/m ² /日 分2経口投与 day1夕食後-day15朝食後			
治療スケジュール・投与日程(投与日は●) (day)			

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	生食250mL	1 本 / body	30 分	●																				
	点滴静注	プロイメンド150mg	1 本 / body		●																				
抗がん剤投与の1時間前に30分かけて投与																									
2	主ルート	アロキシ注ハック0.75mg50mL	1 本 / body	30 分	●																				
	点滴静注	テキサート注射液1.65mg/0.5ml	3 本 / body		●																				
3	側管	5%ブドウ糖液500mL	1 本 / body	90 分	●																				
	点滴静注	イリノテカン	200 mg / m ²		●																				
減量基準有																									
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																				
	点滴静注																								
5	経口投与	カペシタビン	1600 mg/m ² / 日		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
		分2 医師の指示通り																							

※並行して投与する場合は、コメントを入力する。(例: Rp2とRp3を同時に投与開始する。)