

レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成29年9月1日	使用開始日	
登録診療科	消化器内科・外科	申請医師	福永 睦
レジメン名	ペバシズマブ+ロンサーフ(大腸がん)		
疾患名	大腸がん	適応の備考	
適応分類	進行再発		
1コース日数	28 日間	総コース数	有効な限り コース 催吐性リスク 最少度
抗がん剤投与量・投与日	ペバシズマブ5mg/kg day1、ロンサーフ 35mg/m <sup>2</sup> 分2朝夕食後 day1~5内服、day6、7休薬、day8~12内服、day13~28休薬		
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)	(day)		

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●															●												
	点滴静注		/																													
プライミング用																																
2	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●															●												
	点滴静注	ペバシズマブ	5 mg / kg	90 分	●															●												
投与速度は初回は90分、忍容性確認されれば、2回目60分、3回目以降30分で投与可。																																
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●															●												
	点滴静注		/																													
	経口投与	ロンサーフ	35 mg / m <sup>2</sup>		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●																
		分2 朝夕食後	/																													
1日2回朝夕食後、day1~5内服、day6、7休薬、day8~12内服、day13~28休薬																																

※並行して投与する場合は、コメントを入力する。(例:Rp2とRp3を同時に投与開始する。)

【投与上の注意】

ペバシズマブ:希釈は生食のみ。

ペバシズマブ:投与速度は初回は90分、忍容性確認されれば、2回目60分、3回目以降30分で投与可。

ロンサーフ:1日2回朝夕食後、day1~5内服、day6、7休薬、day8~12内服、day13~28休薬。投与量は体表面積に合わせる(添付文書参照)。

体表面積(m<sup>2</sup>) 初回基準量(トリフルリジン相当量)

- ~1.07未満 35mg/回(70mg/日)
- 1.07以上~1.23未満 40mg/回(80mg/日)
- 1.23以上~1.38未満 45mg/回(90mg/日)
- 1.38以上~1.53未満 50mg/回(100mg/日)
- 1.53以上~1.69未満 55mg/回(110mg/日)
- 1.69以上~1.84未満 60mg/回(120mg/日)
- 1.84以上~1.99未満 65mg/回(130mg/日)
- 1.99以上~2.15未満 70mg/回(140mg/日)
- 2.15以上~ 75mg/回(150mg/日)