

レジメン登録フォーマット

| | | | |
|--------|----------|-------|----------------------------|
| 申請年月日 | | 使用開始日 | 平成27年1月1日 |
| 登録診療科 | 消化器内科・外科 | 申請医師 | 化学療法委員会承認 平成 年 月 |
| レジメン名 | 5-FU+PTX | | |
| 疾患名 | 胃がん | 適用の備考 | 総コース数 術前:2クール、進行がん:PDになるまで |
| 適応分類 | 進行再発 | | |
| 1コース日数 | 28 日間 | 総コース数 | コース催吐性リスク軽度 |

抗がん剤投与量・投与日 5-FU 600mg/m²/日 day1-5(24時間精密持続静注)、パクリタキセル80mg/m² day8,15,22

治療スケジュール・投与日程(投与日は●) (day)

| 投与順 | ルート・方法 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
|-----|--------|-------------------|-------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
| 1 | 側管 | 生食50mL | 1 本 / body | 30 分 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | デキサート注射液6.6mg/2ml | 1 本 / body | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 主ルート | 生食500mL | 1 本 / body | 12 時間 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 精密持続点滴 | 5-FU | 300 mg / m ² | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 主ルート | 生食500mL | 1 本 / body | 12 時間 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 精密持続点滴 | 5-FU | 300 mg / m ² | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 主ルート | 生食50mL | 1 本 / body | 30 分 | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | デキサート注射液6.6mg/2ml | 1 本 / body | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ファモチジン注20mg | 1 本 / body | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 主ルート | 生食250mL | 1 本 / body | 60 分 | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | パクリタキセル | 80 mg / m ² | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 主ルート | 生食50mL | 1 本 / body | 5 分 | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※並行して投与する場合は、コメントを入力する。(例:Rp2とRp3を同時に投与開始する。)

【投与上の注意】

パクリタキセル: 前投薬として、パクリタキセル投与の30分前に、レスタミン5錠の内服、デキサート注、ファモチジン20mg静注が必要。

パクリタキセル: DEHPフリー(フィルターつき)点滴セット使用。0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを使用し投与すること

パクリタキセル: アルコール不耐症がないことを確認する。