

レジメン登録フォーマット

| | | | |
|--|---------------------|-------|-------------------|
| 申請年月日 | | 使用開始日 | 平成27年1月1日 |
| 登録診療科 | 消化器内科・外科 | 申請医師 | 化学療法委員会承認年 平成 年 月 |
| レジメン名 | DCS(胃がん)(ホスアプレピタント) | | |
| 疾患名 | 胃がん | 適応の備考 | |
| 適応分類 | 進行再発 | | |
| 1コース日数 | 28 日間 | 総コース数 | コース 催吐性リスク 高度 |
| 抗がん剤投与量・投与日 ドセタキセル40mg/m ² day1、シスプラチン60mg/m ² day1、S-1 80mg~120mg/body 分2朝夕食後 経口投与 day1-day14まで | | | |
| 治療スケジュール・投与日程(投与日は●) (day) | | | |

| 投与順 | ルート・方法 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 主ルート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | フィジオ140輸液500mL | 2 本 / body | 2 時間 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 主ルート | 生食250mL | 1 本 / body | 30 分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | ホスアプレピタント注150mg | 1 本 / body | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 主ルート | ハロ/セトロン注ハック0.75mg50mL | 1 本 / body | 30 分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | デキサート注射液6.6mg/2ml | 1 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | デキサート注射液1.65mg/0.5mL | 2 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 主ルート | 生食250mL | 1 本 / body | 60 分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | ドセタキセル | 40 mg / m ² | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 主ルート | 生食500mL | 1 本 / body | 2 時間 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | シスプラチン | 60 mg / m ² | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シスプラチンと同量の生食を抜いてから混注する(合計500mLとする) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 主ルート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | フィジオ140輸液500mL | 2 本 / body | 2 時間 | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 側管 | 生食100mL | 1 本 / body | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | デキサート注射液6.6mg/2ml | 1 本 / body | 30 分 | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 側管 | 生食100mL | 1 本 / body | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | デキサート注射液6.6mg/2ml | 2 本 / body | 30 分 | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| day4は主ルート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 経口投与 | S-1 | 9999 mg / m ² | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 分2 朝夕食後 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (体表面積) | 1.25m ² 未満 | 80mg/day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.25~1.5m ² 未満 | 100mg/day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.5m ² 以上 | 120mg/day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※並行して投与する場合は、コメントを入力する。(例:Rp2とRp3を同時に投与開始する。)

【投与上の注意】

S-1は、day1~day14まで服用、day15~day28 休薬期間

シスプラチン:希釈は生食のみ。

シスプラチン:腎毒性軽減のためhydrationが必要。

【day1】シスプラチン投与の前後にそれぞれ補液500mL2本/120分を投与、適宜フロセミド注を投与

【day2,3】補液500mL2本/120分/dayを投与

・ホスアプレピタントは血管痛が報告されているため、溶解には可能な限り生食250mLを使用すること(最低でも100mL以上)。

・ホスアプレピタントは抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴すること。

・ホスアプレピタントの次に5-HT3受容体拮抗薬+デキサート注を投与して、その次に抗がん剤を投与すること。