レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成30年11月12日	使用開始日			
登録診療科	消化器内科・外科	申請医師	岡田一幸	化学療法委員会承認年月	平成　30 年　12 月
レジメン名	トラスツズマブ【初回】+SOX				
疾患名	胃がん	適応の備考	対象：HER2陽性胃がんのみ		
適応分類	進行再発				
1コース日数	21　日間	総コース数	コース	催吐性リスク	中等度
抗がん剤投与量・投与日	トラスツズマブ8mg/kg day1、オキサリプラチン100mg/㎡ day1、S－1　80mg～120mg/body 分2朝夕食後　day1夕食後-day15朝食後				

治療スケジュール ・ 投 与 日 程 (投 与 日 は ●)　　(day)

投与順	ルート・方法	薬　剤　名	投　与　量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	生食250mL	1 本 / body	90 分	●																				
	点滴静注	トラスツズマブ	8 mg / kg		●																				
		注射用水20mL	1 本 / body		●																				
		投与時間(初回投与)90分、(2回目以降)30分可																							
2	主ルート	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ注ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL	1 本 / body	30 分	●																				
	点滴静注	ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液6.6mg/2ml	1 本 / body		●																				
		ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液1.65mg/0.5mL	2 本 / body		●																				
			/																						
3	主ルート	5%ブドウ糖液250mL	1 本 / body	2 時間	●																				
	点滴静注	オキサリプラチン	100 mg / ㎡		●																				
			/																						
4	主ルート																								
	点滴静注	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																				
5			/																						
	経口投与	S－1	9999 mg / body		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
		分2　朝夕食後	/																						
	(体表面積)　1.25㎡未満　80mg/day																								
	1.25～1.5㎡未満　100mg/day																								
	1.5㎡以上　120mg/day																								
	day1夕食後からday15朝食後まで服用する																								
6			/																						
	経口投与	デカドロン錠	8 mg / body			●	●	●																	
			/																						
	分2　朝昼食後																								

※並行して投与する場合は、コメントを入力する。(例：Rp2とRp3を同時に投与開始する。)

【投与上の注意】

このレジメンは、トラスツズマブ初回投与患者に使用する

トラスツズマブの投与量は、初回8mg/kg、2回目以降6mg/kg　day1

トラスツズマブの投与時間は、初回投与90分、2回目以降は30分可

トラスツズマブ：次回以降予定投与が遅れた場合、前回投与日から1週間以内の時は、6mg/kgを投与する。1週間を超えた時は、改めて8mg/kgを投与し、次回以降は6mg/kgを3週間間隔で投与。

day4のデカドロン錠は、状況に応じて投与の可否を選択できる

day1のデキサート注は、6.6mgでもよい

デキサメタゾンを積極的に使用できない場合は、デキサメタゾンday2～4の代わりに5HT3拮抗薬day2～4を追加する

オキサリプラチン：希釈は5%ブドウ糖液のみ。