

レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成27年2月16日	使用開始日	平成27年3月16日
登録診療科	消化器内科・外科	申請医師	森田香織
レジメン名	ザノサー5日間連続投与		
疾患名	膵・消化管 神経内分泌腫瘍	適応の備考	
適応分類	進行・再発		
1コース日数	42 日間	総コース数	有効な限り コース 催吐性リスク 高度
抗がん剤投与量・投与日	ザノサー500mg/m ² day1~5.		
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)	(day)		

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	~42	
1	主ルート	生食500mL	1 本 / body	1 時間	●	●	●	●	●																								
	点滴静注		/																														
2	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																												
	点滴静注	プロイメント注150mg	1 本 / body	30 分	●																												
3	主ルート	アロキシ注ハッグ0.75mg	1 本 / body		●																												
	点滴静注	デキサート注6.6mg	1 本 / body	30 分	●																												
		デキサート注1.65mg	2 本 / body		●																												
3	主ルート	生食100mL	1 本 / body			●	●	●	●																								
	点滴静注	デキサート注6.6mg	1 本 / body	30 分		●	●	●	●																								
		デキサート注1.65mg	2 本 / body			●	●	●	●																								
4	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●	●	●	●	●																								
	点滴静注	ザノサー注	500 mg / m ²	30 分	●	●	●	●	●																								
5	主ルート	マンニトール注300mL	0.66 本 / body	30 分	●	●	●	●	●																								
	点滴静注		/																														
6	主ルート	生食500mL	1 本 / body	1 時間	●	●	●	●	●																								
	点滴静注		/																														

【投与上の注意】

- ・プロイメントは血管痛が報告されているため、溶解には可能な限り生食250mLを使用すること(最低でも100mL以上)。
- ・プロイメントは抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴すること。
- ・プロイメントの次に5-HT3受容体拮抗薬+デキサート注を投与して、その次に抗がん剤を投与すること。
- ・ザノサー:血管痛出現時は投与時間を2時間まで延長する。