

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日	平成27年1月1日		
登録診療科	消化器内科・外科	申請医師	化学療法委員会承認年月	平成	年 月
レジメン名	放射線化学療法 (CRT) (GEM+RT)				
疾患名	膵がん	適応の備考			
適応分類	進行再発				
1コース日数	38	日間	総コース数	コース	催吐性リスク 軽度
抗がん剤投与量・投与日 ゲムシタピン(ジェムザール) 250mg/m ² day1,8,15,22,29,36					
治療スケジュール・投与日程 (投与日は●) (day)					

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	30 分	●							●							●							●							
	点滴静注	デキサート注射液6.6mg/2ml	1 本 / body		●							●							●							●							
		デキサート注は、3.3mgでもよい。																															
2	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●							●							●							●							
	点滴静注	ゲムシタピン	250 mg / m ²	30 分	●							●							●						●								
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●							●							●							●							
	点滴静注																																
4																																	
5																																	
6																																	
7																																	
8																																	
9																																	

※並行して投与する場合は、コメントを入力する。(例: Rp2とRp3を同時に投与開始する。)

【投与上の注意】

Rt(50. 4Gy : 1.8Gy × 28fr : day1~5,day8~12,day15~19,day22~26,day29~33,day36~38)

ゲムシタピン: 生食100mLで希釈し、30分で投与。

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日	平成27年1月1日	化学療法委員会承認年月	平成 年 月
登録診療科	消化器内科・外科	申請医師			

レジメン名	放射線化学療法(CRT)(GEM+RT)				
疾患名	膵がん				
適応分類	進行再発	適応の備考			
1コース日数	38	日間	総コース数	コース	催吐性リスク 軽度

抗がん剤投与量・投与日 | ゲムシタピン(ジェムザール) 250mg/m² day1,8,15,22,29,36

治療スケジュール・投与日程(投与日は●) (day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	30分	●							●		
	点滴静注	デキサート注射液6.6mg/2ml	1 本 / body		●							●		
	day1のデキサート注は、3.3mgでもよい。													
2	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●							●		
	点滴静注	ゲムシタピン	250 mg / m ²	30分	●							●		
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5分	●							●		
	点滴静注													
4			/											
			/											
5			/											
			/											
6			/											
			/											
7			/											
			/											
8			/											
			/											
9			/											
			/											

※並行して投与する場合は、コメントを入力する。(例:Rp2とRp3を同時に投与開始する。)

【投与上の注意】

Rt(50.4Gy : 1.8Gy × 28fr : day1~5,day8~12,day15~19,day22~26,day29~33,day36~38)

ゲムシタピン:100mLで希釈し、30分で投与。