

【減量基準】

ハラヴェン投与にあたっては、以下の基準を参考に必要に応じて、投与を延期、減量又は休薬すること。

〈各サイクル1週目〉

投与開始基準下記の基準を満たさない場合、投与を延期する。

- ・好中球数: 1,000/mm³以上
- ・血小板数: 75,000/mm³以上
- ・非血液毒性: Grade2以下

減量基準前サイクルにおいて以下の副作用等が発現した場合、減量注)した上で投与する。

- ・7日間を超えて継続する好中球数減少(500/mm³未満)
- ・発熱又は感染を伴う好中球数減少(1,000/mm³未満)
- ・血小板数減少(25,000/mm³未満)
- ・輸血を要する血小板数減少(50,000/mm³未満)
- ・Grade3以上の非血液毒性
- ・副作用等により、2週目に休薬した場合

〈各サイクル2週目〉

投与開始基準下記の基準を満たさない場合、投与を延期する。

- ・好中球数: 1,000/mm³以上
- ・血小板数: 75,000/mm³以上
- ・非血液毒性: Grade2以下

投与再開基準投与延期後1週間以内に上記の投与開始基準を満たした場合、減量して投与する注)。

休薬基準投与延期後1週間以内に上記の投与開始基準を満たさない場合は、休薬する。

注)減量を行う際、次の用量を参考にすること。

減量前の投与量: 1.4mg/m² → 減量後の投与量: 1.1mg/m²

減量前の投与量: 1.1mg/m² → 減量後の投与量: 0.7mg/m²

減量前の投与量: 0.7mg/m² → 減量後の投与量: 投与中止を考慮

肝機能障害を有する患者に投与する場合は、減量を考慮すること。