

レジメン登録フォーマット

| | | | | |
|--------|------------------------------|----|-------|---|
| 申請年月日 | 平成30年10月24日 | | 使用開始日 | |
| 登録診療科 | 乳腺外科 | | 申請医師 | 小西医師 |
| レジメン名 | パージェタ+トラスツズマブ【初回】(併用ケモ中止時)再発 | | | |
| 疾患名 | 乳がん(HER2陽性) | | 適応の備考 | HER2陽性の手術不能又は再発乳がん パージェタ、トラスツズマブおよび化学療法併用で化学療法が中止された場合に使用 |
| 適応分類 | 進行・再発 | | | |
| 1コース日数 | 21 | 日間 | 総コース数 | 有効な限り コース 催吐性リスク 軽度 |

抗がん剤投与量・投与日 || パージェタ注840mg、トラスツズマブ注8mg/kg day1

治療スケジュール・投与日程(投与日は●) (day)

| 投与順 | ルート・方法 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---------------------------|---------------------------|-----------|---------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 主ルート | 生食50mL | 1 本 / body | 5 分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | プライミング用 | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 主ルート | 生食250mL | 1 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | パージェタ注 | 840 mg / body | 60 分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 投与時間(初回投与)60分、(2回目以降)30分可 | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 主ルート | 生食250mL | 1 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | トラスツズマブ注 | 8 mg / kg | 90 分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | 注射用水100mL | 1 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投与時間(初回投与)90分、(2回目以降)30分可 | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 主ルート | 生食50mL | 1 本 / body | 5 分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【投与上の注意】

このレジメンは、パージェタ、トラスツズマブ初回投与患者に使用する

パージェタ: 初回投与時間は60分。初回投与時の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。

パージェタトラスツズマブ併用: 次回以降予定投与が遅れた場合、前回投与日から6週間未満の時はパージェタ420mg/bodyトラスツズマブ6mg/kgを投与する。

6週間以上の時は改めてパージェタ840mg/body、トラスツズマブ8mg/kgで投与。

トラスツズマブ: 初回投与時間は90分。初回投与時の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。