

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日	
登録診療科	血液内科	申請医師	
レジメン名	ALL202-0 地固め第3コース(C3)		
疾患名	急性リンパ性白血病	適応の備考	
適応分類	地固め療法		
1コース日数	42 日間	総コース数	コース 催吐性リスク day1.8.15.29:中等度、それ以外:最小度
抗がん剤投与量・投与日	オンコピン1.3mg/m ² day1.8.15、ドキソルビシン30mg/m ² day1.8.15、エンドキサン1000mg/m ² day29、キロサイド75mg/m ² day29-33.36-40、ロイケリン散60mg/m ² day29-42、 デカドロン錠10mg/m ² day1-8.15-22 【随注】メトレキセート15mg/body、キロサイド40mg/body、デキサメタゾン4mg/body day1.29		

治療スケジュール・投与日程(投与日は●)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42								
1	主ルート 点滴静注	グラニセトロン注ハック1mg/50mL	1 本 / body	15 分	●							●								●																																		
2	主ルート 点滴静注	生食50mL オンコピン注	1 本 / body 1.3 mg / m ²	5 分	●							●								●																																		
最大投与量は2mg/body/回を超えないこと																																																						
3	主ルート 点滴静注	生食100mL ドキソルビシン注	1 本 / body 30 mg / m ²	60 分	●							●								●																																		
総投与量は500mg/m ² まで																																																						
4	主ルート 点滴静注	生食500mL エンドキサン注 閉鎖式システム使用	1 本 / body 1000 mg / m ²	3 時間																																																		
5	主ルート 点滴静注	生食50mL ルートキープ用	1 本 / body	30 分																																																		
6	主ルート 点滴静注	生食250mL キロサイド注	1 本 / body 75 mg / m ²	60 分																																																		
7	主ルート 点滴静注	生食50mL	1 本 / body	5 分	●							●									●																																	
8	なし 随注	生食20mL メトレキセート注 キロサイド注 デキサート注1.65mg	1 本 / body 15 mg / body 40 mg / body 2 本 / body		●							●																																										
9	経口投与 分1 眼前	ロイケリン散	60 mg / m ²																																																			
10	経口投与 医師の指示通り	デカドロン錠	10 mg / m ²		●	●	●	●	●	●	●	●									●	●	●	●	●	●	●	●																										

【投与上の注意】
 キロサイド:大量投与時、結膜炎予防のためのステロイド点眼を行う。例えば0.1%フルメトロン点眼、1日3回、両眼、キロサイド投与前日から投与終了の翌日まで。
 デキサート:空腹時血糖値が250mg/dL以上の場合、デカドロン錠を半量に減量すること。