

レジメン登録フォーマット

申請年月日	平成30年10月29日	使用開始日	
登録診療科	乳腺外科	申請医師	小西医師
レジメン名	パージェタ+トラスツズマブ+パクリタキセル(3週1回)【初回】初発		
疾患名	乳がん	適応の備考	HER2陽性乳がん 術後補助化学療法、術前化学療法
適応分類	術前術後補助化学療法		
1コース日数	21 日間	総コース数	術前術後合計1年 コース 催吐性リスク 軽度
抗がん剤投与量・投与日	パージェタ840mg/body day1、トラスツズマブ8mg/kg day1、パクリタキセル175mg/m <sup>2</sup> day1		
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)	(day)		

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																				
	点滴静注		/																						
ブライミング用																									
2	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																				
	点滴静注	パージェタ注	840 mg / body	60 分	●																				
投与時間(初回投与)60分、(2回目以降)30分可																									
3	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																				
	点滴静注	トラスツズマブ注 注射用水100mL	8 mg / kg 1 本 / body	90 分	●																				
投与時間(初回投与)90分、(2回目以降)30分可																									
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body		●																				
	点滴静注	デキサート注6.6mg ファモチジン注20mg	1 本 / body 1 本 / body	30 分	● ●																				
5	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																				
	点滴静注	パクリタキセル注	175 mg / m <sup>2</sup>	3 時間	●																				
6	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																				
	点滴静注		/																						
7	経口投与	レスタミンコーワ錠	5 錠 / body		●																				
			/																						
パクリタキセル投与の30分前																									

【投与上の注意】

このレジメンは、トラスツズマブ初回投与患者に使用する  
 トラスツズマブ: 初回投与時間は90分。初回投与時の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。  
 トラスツズマブ: 初回投与は8mg/kg/回、2回目以降は6mg/kg/回。  
 パージェタ: 初回投与時間は60分。初回投与時の忍容性が良好であれば、2回目以降は30分まで短縮できる。

パージェタトラスツズマブ併用: 次回以降予定投与が遅れた場合、前回投与日から6週間未満の時はパージェタ420mg/bodyトラスツズマブ6mg/kgを投与する。  
 6週間以上の時は改めてパージェタ840mg/body、トラスツズマブ8mg/kgで投与。6週間以上の時は改めてパージェタ840mg/body、トラスツズマブ8mg/kgで投与。

パクリタキセル: 前投薬としてレスタミン5錠の内服、デキサート注、ファモチジン20mg静注が必要。

パクリタキセル: DEHPフリー(フィルターつき)点滴セット使用。

パクリタキセル: アルコール不耐症がないことを確認する。