

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日	
登録診療科	血液内科	申請医師	
レジメン名	ALL202-U Consolidation Therapy		
疾患名	急性リンパ性白血病	適応の備考	15歳以上25歳未満の患者を対象とする
適応分類	地固め療法		
1コース日数	28 日間	総コース数	1 コース
		催吐性リスク	day1,2,8:中等度、それ以外は最小度
抗がん剤投与量・投与日	エンドキサン750mg/m ² day1,8、ピノルビン25mg/m ² day1-2、キロサイド75mg/m ² day1-6,8-13、ロイケリン散50mg/m ² day1-14、 【髄注】メソトレキセート12mg/body、キロサイド30mg/body、ソルコーテフ25mg/body day1,8		

治療スケジュール・投与日程（投与日は●） (day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	主ルート	グラニセトロン注ハック1mg/50mL	1 本 / body	30 分	●	●						●																				
	点滴静注																															
2	主ルート	生食250mL	1 本 / body									●																				
	点滴静注	エンドキサン注	750 mg / m ²	60 分	●							●																				
		閉鎖式システム使用																														
3	主ルート	生食100mL	1 本 / body								●	●																				
	点滴静注	ピノルビン注	25 mg / m ²	60 分	●	●																										
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body	30 分			●	●	●	●			●	●	●	●	●															
	点滴静注																															
		ルートキープ用																														
5	主ルート	生食250mL	1 本 / body				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															
	点滴静注	キロサイド注	75 mg / m ²	60 分	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															
6	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●																
	点滴静注																															
7	なし	生食20mL	1 本 / body				●					●																				
	髄注	メソトレキセート注	12 mg / body				●					●																				
		キロサイド注	30 mg / body					●				●																				
		ソルコーテフ注100mg	0.25 本 / body					●				●																				
8	経口投与	ロイケリン散	50 mg / m ²		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●															
	分1 眠前																															

【投与上の注意】

キロサイド:大量投与時、結膜炎予防のためのステロイド点眼を行う。例えば0.1%フルメロン点眼、1日3回、両眼、キロサイド投与前日から投与終了の翌日まで。