

レジメン登録フォーマット

申請年月日	2020年9月23日	使用開始日																																
登録診療科	共通診療科	申請医師	檜原啓之																															
登録診療科	共通診療科	化学療法委員会承認年月	2020年 10月																															
レジメン名	キイトルーダ(6週毎)(MSI-High固形がん)																																	
疾患名	MSI-High固形がん	適応の備考	がん化学療法後に増悪した高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する患者 (標準的な治療が困難な場合に限る)																															
適応分類	進行・再発																																	
1コース日数	42 日間	総コース数	有効な限り コース 催吐性リスク 最少度																															
抗がん剤投与量・投与日	キイトルーダ day1																																	
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)	(day)																																	
投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	~	42
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																													
	点滴静注		/																															
2	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●																													
	点滴静注	キイトルーダ	400 mg / body	30 分	●																													
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																													
	点滴静注		/																															

【投与上の注意】

キイトルーダ: 0. 2~5 μmのインラインフィルターを使用して投与する。

キイトルーダ: 希釈後の最終濃度を1~10mg/mLとする。

キイトルーダ: Infusion reaction経験例では次回より投与前1.5時間(±30分)に以下の薬剤で前処置を行う。

- ・ レスタミン5錠経口投与(又は同等の抗ヒスタミン薬)
- ・ アセトアミノフェン500~1,000mg経口投与(又は同等の解熱剤)