

レジメン登録フォーマット

申請年月日	2020年6月18日	使用開始日	
登録診療科	腫瘍内科	申請医師	榎原啓之
レジメン名	オブジーボ+ヤーボイ併用療法(悪性黒色腫)		
疾患名	悪性黒色腫	適応の備考	根治切除不能な悪性黒色腫
適応分類	進行・再発		
1コース日数	21 日間	総コース数	4 コース
抗がん剤投与量・投与日	オブジーボ 80mg/body、ヤーボイ 3mg/kg day1		
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)	(day)		

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																				
	点滴静注																								
2	主ルート	生食50mL	1 本 / body		●																				
	点滴静注	オブジーボ	80 mg / body	30 分	●																				
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	30 分	●																				
	点滴静注																								
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body		●																				
	点滴静注	ヤーボイ	3 mg / kg	90 分	●																				
5	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																				
	点滴静注																								

【投与上の注意】

オブジーボ:0. 22または0. 2μmのインラインフィルターを使用して投与する。
 オブジーボ:最終濃度が0. 35mg/mLになるように希釈すること。
 ヤーボイ:0. 2~1. 2μmのインラインフィルターを使用して投与する。
 ヤーボイ:オブジーボ投与完了後30分以上の間隔をあけてから投与すること。
 ヤーボイ:希釈後の最終濃度は1~4mg/mLとする。

【減量基準】

ヤーボイ

- Grade 2の副作用(内分泌障害及び皮膚障害を除く)、Grade 3の皮膚障害、症候性の内分泌障害
 処置: Grade 1以下又はベースラインに回復するまで投与を延期する。内分泌障害については、症状が回復するまで投与を延期する。
 上記基準まで回復しない場合は、投与を中止する。
- Grade 3以上の副作用(内分泌障害及び皮膚障害を除く)、局所的な免疫抑制療法が有効でないGrade 2以上の眼障害、Grade 4の皮膚障害
 処置: 投与を中止する。