

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日	
登録診療科	血液内科	申請医師	化学療法委員会承認年月 平成 22 年 3 月
レジメン名	ALL202-U Reinduction Therapy		
疾患名	急性リンパ性白血病	適応の備考	15歳以上25歳未満の患者を対象とする
適応分類	地固め療法		
1コース日数	28 日間	総コース数	1 コース 催吐性リスク day1.8: 中等度、それ以外は最小度
抗がん剤投与量・投与日	オンコビン1.5mg/m ² day1.8.15、ピノルビン25mg/m ² day1.8、エンドキサン500mg/m ² day1.8、ロイナーゼ6000単位/m ² day1.3.5.8.10.12、プレドニン錠40mg/m ² day1-14、 【髄注】メトレキセート12mg/body、キロサイド30mg/body、ソルコーテフ25mg/body day1		

治療スケジュール・投与日程（投与日は●）

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	(day)																											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	主ルート	グラニセトロン注ハック1mg/50mL	1 本 / body	30 分	●																											
	点滴静注		/	/																												
2	主ルート	生食50mL	1 本 / body	30 分																												
	点滴静注	ルートキープ用	/	/																												
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body		●																											
	点滴静注	オンコビン注	1.5 mg / m ²	5 分	●																											
最大投与量は2mg/body/回。静脈注射または点滴静注で行う。																																
4	主ルート	5%ブドウ糖液100mL	1 本 / body		●																											
	点滴静注	ピノルビン注	25 mg / m ²	60 分	●																											
5	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●																											
	点滴静注	エンドキサン注 閉鎖式システム使用	500 mg / m ²	60 分	●																											
6	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																											
	点滴静注		/	/																												
7	なし	5%ブドウ糖液20mL	0.1 本 / body		●	●	●																									
	筋肉注射	ロイナーゼ注	6000 単位 / m ²		●	●	●																									
8	なし	生食20mL	1 本 / body		●																											
	髄注	メトレキセート注	12 mg / body		●																											
		キロサイド注	30 mg / body		●																											
		ソルコーテフ注100mg	0.25 本 / body		●																											
中枢神経病変陰性時は、day11.15の髄注はしない。																																
9	経口投与	プレドニン錠5mg	40 mg / m ²		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	分3 医師の指示通り																															

【投与上の注意】

・day1.8のデキサート注は、6.6mgでもよい。
 ピノルビン: 溶解は5%ブドウ糖液のみ。
 ロイナーゼ: 生食で直接溶解すると白濁するおそれがあるので5%ブドウ糖液を使用する