レジメン登録フォーマット

申請年月日	2020年10月29日	使用開始日			
登録診療科	内科	申請医師	楢原啓之	化学療法委員会承認年月	年　月
レジメン名	オプジーボ＋ヤーボイ併用療法(オプジーボ単独2週毎投与)(悪性黒色腫)				
疾患名	悪性黒色腫	適応の備考			
適応分類	進行・再発				
1コース日数	14　日間	総コース数	有効な限り　コース	催吐性リスク	最小度
抗がん剤投与量・投与日	オプジーボ　240mg/body　day1				

治療スケジュール ・ 投 与 日 程 (投 与 日 は ●)　(day)

投与順	ルート・方法	薬 剤 名	投 与 量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●													
	点滴静注		/															
2	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●													
	点滴静注	オプジーボ	240 mg / body	30 分	●													
			/															
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●													
	点滴静注		/															

【投与上の注意】
このレジメンは、オプジーボ＋ヤーボイ併用療法を4回施行後に使用する。
オプジーボ:0．22または0．2μ mのインラインフィルターを使用して投与する。
オプジーボ:希釈後の総液量は60mL以上を目安とする。体重30kg以上の場合、生食100mL、体重30kg未満の場合、生食50mLに希釈する。
オプジーボ:希釈後の最終濃度0.35mg/mL未満では、点滴溶液中の安定性が確認されていない。