

レジメン登録フォーマット

申請年月日	2020年10月29日	使用開始日	
登録診療科	内科	申請医師	檜原啓之
レジメン名	オブジーボ+ヤーボイ併用療法(オブジーボ単独4週毎投与)(悪性黒色腫)		
疾患名	悪性黒色腫	適応の備考	
適応分類	進行・再発		
1コース日数	28 日間	総コース数	有効な限り コース 催吐性リスク 最小度

抗がん剤投与量・投与日 | オブジーボ 480mg/body day1

治療スケジュール・投与日程(投与日は●) (day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																											
	点滴静注		/																													
2	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●																											
	点滴静注	オブジーボ	480 mg / body	30 分	●																											
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																											
	点滴静注		/																													

【投与上の注意】

このレジメンは、オブジーボ+ヤーボイ併用療法を4回施行後に使用する。

オブジーボ: 0.22または0.2μ mのインラインフィルターを使用して投与する。

オブジーボ: 希釈後の総液量は60mL以上を目安とする。体重30kg以上の場合、生食100mL、体重30kg未満の場合、生食50mLに希釈する。

オブジーボ: 希釈後の最終濃度0.35mg/mL未満では、点滴溶液中の安定性が確認されていない。