

レジメン登録フォーマット

申請年月日	2020/6/26	使用開始日	
登録診療科	婦人科	申請医師	増原 完治
レジメン名	CBDCA単剤(子宮がん・卵巣がん)(アプレピタントカプセル)		
疾患名	子宮がん・卵巣がん		
適応分類	進行・再発・術前・術後補助化学療法	適応の備考	
1コース日数	21 日間	総コース数	有効な限り コース 催吐性リスク 高度
抗がん剤投与量・投与日 カルボプラチン5AUC/body day1			

				(day)																					
投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	アロキン注ハック0.75mg	1 本 / body		●																				
	点滴静注	デキサート注6.6mg	1 本 / body	30 分	●																				
		デキサート注1.65mg	2 本 / body	/		●																			
2	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																				
	点滴静注	カルボプラチン注	5 AUC / body	60 分	●																				
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																				
	点滴静注		/																						
4	経口投与	アプレピタントカプセル	125 mg / body		●																				
		抗がん剤の投与1時間～1時間30分前に服用																							
5	経口投与	アプレピタントカプセル	80 mg / body			●	●																		
		分1午前中に服用																							
6	経口投与	デカドロン錠	8 mg / body			●	●	●																	
		分2 朝昼食後																							

【投与上の注意】

アプレピタントカプセル:各コースにおいて、投与期間は3日間を目安とする。成人で5日間・12歳以上の小児で3日間を超えて投与した際の有効性及び安全性は確立していない。

アプレピタントカプセル:原則としてコルチコステロイド及び5-HT3受容体拮抗型制吐剤と併用して使用すること。

アプレピタントカプセル:抗悪性腫瘍剤の投与1時間～1時間30分前に投与し、2日目以降は午前中に投与すること。