

レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日	
登録診療科	婦人科	申請医師	
レジメン名	イリノテカン単剤(子宮頸がん・卵巣がん)(ホスアプレビタント)		
疾患名	子宮頸がん・卵巣がん	適応の備考	
適応分類			
1コース日数	28 日間	総コース数	有効な限り コース 催吐性リスク 中等度

抗がん剤投与量・投与日 || イリノテカン100mg/m² day1.8.15

治療スケジュール・投与日程(投与日は●) (day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●							●							●													
	点滴静注	ホスアプレビタント注150mg	1 本 / body	30 分	●							●							●													
2	主ルート	グラニセトロン注ハッグ1mg/50mL	1 本 / body		●							●							●													
	点滴静注	デキサート注1.65mg	3 本 / body	30 分	●							●							●													
3	主ルート	生食500mL	1 本 / body		●							●							●													
	点滴静注	イリノテカン注	100 mg / m ²	90 分	●							●							●													
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●							●							●													
	点滴静注																															

【投与上の注意】

- ・ホスアプレビタントは血管痛が報告されているため、溶解には可能な限り生食250mLを使用すること(最低でも100mL以上)。
- ・ホスアプレビタントは抗がん剤投与の1時間前に30分かけて点滴すること。
- ・ホスアプレビタントの次に5-HT3受容体拮抗薬+デキサート注を投与して、その次に抗がん剤を投与すること。