

レジメン登録フォーマット

申請年月日	2019/8/29	使用開始日																							
登録診療科	共通診療科	申請医師	檜原啓之																						
レジメン名	キイトルーダ(3週毎) (MSI-High固形がん)																								
疾患名	MSI-High固形がん	適応の備考	がん化学療法後に増悪した高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する患者 (標準的な治療が困難な場合に限る)																						
適応分類	進行・再発	1コース日数	21 日間																						
1コース日数	21 日間	総コース数	有効な限り コース 催吐性リスク 最少度																						
抗がん剤投与量・投与日 キイトルーダ day1																									
治療スケジュール・投与日程 (投与日は●) (day)																									
投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																				
	点滴静注		/																						
2	主ルート	生食100mL キイトルーダ	1 本 / body 200 mg / body	30 分	●	●																			
	点滴静注		/																						
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																				
	点滴静注		/																						

【投与上の注意】

キイトルーダ: 0. 2~5µmのインラインフィルターを使用して投与する。

キイトルーダ: 希釈後の最終濃度を1~10mg/mLとする。

キイトルーダ: Infusion reaction経験例では次回より投与前1.5時間(±30分)に以下の薬剤で前処置を行う。

- ・ レスタミン5錠経口投与 (又は同等の抗ヒスタミン薬)
- ・ アセトアミノフェン500~1,000mg経口投与 (又は同等の解熱剤)