

レジメン登録フォーマット

申請年月日	2019/12/5	使用開始日	
登録診療科	血液内科	申請医師	松永一美
レジメン名	E-Pd(3コース目以降)		
疾患名	多発性骨髄腫	適応の備考	
適応分類	進行・再発		
1コース日数	28 日間	総コース数	有効な限り コース 催吐性リスク 最小度
抗がん剤投与量・投与日	エムブリシテリ20mg/kg day1、ボマリスト4mg/body day1-day21、レナデックス 28mg又は8mg/body day1 40mg又は20mg/body day8.15.22		
治療スケジュール・投与日程(投与日は●)	(day)		

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	主ルート	生食50mL	1 本 / body	15 分	●																												
	点滴静注	デキサート注6.6mg	1 本 / body		●																												
			ファモチジン注20mg	1 本 / body		●																											
2	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																												
	点滴静注		/																														
3	主ルート	生食250mL	1 本 / body		●																												
	点滴静注	エムブリシテリ注	20 mg / kg	下記	●																												
			注射用水100mL	1 本 / body		●																											
1Vあたり300mg製剤は13mL、400mg製剤は17mLの注射用水で溶解																																	
◆希釈液量体重規定あり◆:体重50kg未満:生食150mL(抜き取り100mL)																																	
50kg~90kg:生食250mL、90kg超:生食350mLで希釈する																																	
4	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																												
	点滴静注		/																														
	経口投与	ボマリストカプセル4mg 1日1回	4 mg / body		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	経口投与	レナデックス錠4mg 1日1回	28 or 8 mg / body		●																												
75歳以下:28mg/日、75歳超:8mg/日																																	
	経口投与	レナデックス錠4mg 1日1回	40 or 20 mg / body									●								●							●						
75歳以下:40mg/日、75歳超:20mg/日																																	
	経口投与	ポララミン錠2mg ジクロフェナクNa錠25mg	1 錠 / body 1 錠 / body		● ●																												
エムブリシテリ注投与の30分前までに内服																																	

【投与上の注意】

エムブリシテリ:前投薬としてポララミン(2)1錠、ジクロフェナクNa(25)1錠を30分前までに内服する。  
 エムブリシテリ:3コース目以降レジメンの1回目の投与速度は、初回は180mL/h×0.5h、残りは240mL/hとする。  
 エムブリシテリ:3コース目以降レジメンの2回目以降の投与速度は、300mL/hとする。  
 エムブリシテリ:0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを使用し投与すること。