レジメン登録フォーマット

申請年月日		使用開始日			
登録診療科	血液内科	申請医師		化学療法委員会承認年月	平成　　年　　月
レジメン名	APL97寛解導入(B群)				
疾患名	急性前骨髄球性白血病	適応の備考	3000≦WBC＜10000/μLあるいはAPL細胞（芽球＋前骨髄球）≧1000/μLのとき ベサノイドはCR後の地固め第1コース開始前日まで連日経口投与、最長60日まで。		
適応分類	寛解導入療法				
1コース日数	14　日間	総コース数	コース	催吐性リスク	day1-2：中等度、day3-5：最小度
抗がん剤投与量・投与日	ベサノイドカプセル45mg/㎡　day1-12、イダマイシン12mg/㎡　day1-2、キロサイド80mg/㎡　day1-5				

治療スケジュール　・　投与日程（投与日は●）　(day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量		投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	側管	グラニセトロン注バッグ1mg/50mL	1	本 / body	30 分	●	●	●	●	●									
	点滴静注																		
2	主ルート	生食500mL	1	本 / body		●	●	●	●	●									
	精密持続静注	キロサイド注	80	mg / ㎡	24 時間	●	●	●	●	●									
				/															
3	主ルート	生食50mL	1	本 / body	5 分						●								
	点滴静注			/															
	キロサイドフラッシュ用																		
4	側管	生食50mL	1	本 / body	5 分	●	●												
	点滴静注																		
	プライミング用																		
5	側管	生食100mL	1	本 / body		●	●												
	点滴静注	注射用水100mL	1	本 / body	30 分	●	●												
		イダマイシン注	12	mg / ㎡		●	●												
6	側管	生食50mL	1	本 / body	5 分	●	●												
	点滴静注																		
	イダマイシンフラッシュ用																		
		ベサノイドカプセル10mg	45	mg / ㎡		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
	経口投与			/															
				/															
	分3　医師の指示通り																		

【投与上の注意】

キロサイド：大量投与時、結膜炎予防ためのステロイド点眼を行う。例えば0.1%フルメトロン点眼、1日3回、両眼、キロサイド投与前日から投与終了の翌日まで。