

レジメン登録フォーマット

申請年月日	令和2年3月9日	使用開始日	
登録診療科	血液内科	申請医師	松永一美
レジメン名	マイロターグ		
疾患名	CD33陽性の急性骨髄性白血病	再発又は難治性のCD33陽性の急性骨髄性白血病	
適応分類	進行・再発	適応の備考	
1コース日数	14 日間	総コース数	2 コース
			催吐性リスク 分類なし

抗がん剤投与量・投与日 | マイロターグ 9mg/m<sup>2</sup> day1

治療スケジュール・投与日程（投与日は●）

(day)

投与順	ルート・方法	薬剤名	投与量	投与時間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	主ルート	生食100mL	1 本 / body	60 分	●																	
	点滴静注	ソル・コーデフ	100 mg / body		●																	
2	主ルート	生食100mL	1 本 / body		●																	
	点滴静注	マイロターグ注 注射用水100mL 遮光下で1Vあたり注射用水5mLで溶解	9 mg / m <sup>2</sup> 1 本 / body	2 時間	●																	
3	主ルート	生食50mL	1 本 / body	5 分	●																	
	点滴静注		/																			
4	経口投与	レスタミンコーワ錠	5 錠 / body		●																	
		カロナール錠300mg	2 錠 / body		●																	
	マイロターグ投与1時間前に内服																					

【投与上の注意】

マイロターグ: 調製時、安全キャビネットの蛍光灯は消灯すること。

マイロターグ: 希釈後は要遮光(点滴バッグ)

0.2µmのインラインフィルターを使用して投与すること。