

レジメン登録フォーマット

| | | | |
|---|--------------|-------|--------|
| 申請年月日 | 平成20年10月14日 | 使用開始日 | |
| 登録診療科 | 血液内科 | 申請医師 | 西浦 |
| レジメン名 | LVP | | |
| 疾患名 | 悪性リンパ腫(NK/T) | 適応の備考 | |
| 適応分類 | | | |
| 1コース日数 | 21 | 日間 | 総コース数 |
| | | | 有効な限り |
| | | | コース |
| | | | 催吐性リスク |
| | | | 最少度 |
| 抗がん剤投与量・投与日 ロイナーゼ4000単位/body day1-7、オンコピン1mg/body day1、プレドニン100mg/body day1-5 | | | |
| 治療スケジュール・投与日程(投与日は●) | | | |

| 投与順 | ルート・方法 | 薬剤名 | 投与量 | 投与時間 | (day) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-----------|----------------|------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | 主ルート | 生食50mL | 1 本 / body | 30 分 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | ルートキープ用 | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 主ルート | 生食250mL | 1 本 / body | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | ロイナーゼ注 | 4000 単位 / body | 30 分 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 注射用水100mL | 1 本 / body | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 主ルート | 生食100mL | 1 本 / body | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | オンコピン注 | 1 mg / body | 30 分 | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 最大投与量は2mg/body/回を超えないこと。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 主ルート | 生食100mL | 1 本 / body | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | プレドニン注 | 100 mg / body | 30 分 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 主ルート | 生食50mL | 1 本 / body | 5 分 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 点滴静注 | / | / | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【投与上の注意】